

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 г. N 777**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
"ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ
НЕМЕДЛЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ"**

При анализе детской смертности, осложненного течения заболеваний у детей обращают на себя внимание случаи позднего обращения родителей и (или) иных законных представителей ребенка за медицинской помощью из-за недостаточных знаний о признаках заболеваний, представляющих угрозу жизни и здоровью ребенка.

В целях профилактики детской смертности, улучшения организации и качества оказания медицинской помощи детям приказываю:

1. Утвердить Методические [рекомендации](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" (приложение).

2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения:

2.1. Обеспечить наличие Методических [рекомендаций](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" в подведомственном учреждении.

2.2. Ознакомить с Методическими [рекомендациями](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" под роспись всех врачей-педиатров, врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей других специальностей, участвующих в оказании медицинской помощи детям.

2.3. Обеспечить предоставление Методических [рекомендаций](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" родителям и (или) иным законным представителям ребенка с отметкой о дате предоставления данных рекомендаций в медицинской [карте](#) пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у).

2.4. Обеспечить наличие в свободном доступе (информационные стенды, раздаточный материал и пр.) Методических [рекомендаций](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" в подведомственном учреждении.

[КонсультантПлюс: примечание.](#)

[Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.](#)

2.4. Отчет об исполнении приказа предоставить в департамент в срок до 15.06.2015.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, главным врачам ведомственных медицинских организаций:

3.1. Обеспечить наличие Методических [рекомендаций](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" в подведомственных учреждениях.

3.2. Ознакомить с Методическими [рекомендациями](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" под роспись всех врачей-педиатров, врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей других специальностей, участвующих в оказании медицинской помощи детям.

3.3. Обеспечить предоставление Методических [рекомендаций](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью"

родителям и (или) иным законным представителям ребенка с отметкой о дате предоставления данных рекомендаций в медицинской [карте](#) пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у).

3.4. Обеспечить наличие в свободном доступе (информационные стенды, раздаточный материал и пр.) Методических [рекомендаций](#) "Памятка для родителей: ситуации, требующие немедленного обращения за медицинской помощью" в подведомственных учреждениях.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента Е.М.Зеленину.

Начальник департамент
В.М.ШАН-СИН

Утверждаю
Начальник департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
В.М.Шан-Син
от 1 июня 2015 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ"

1. Температура тела выше 38 °С, которая сопровождается дрожанием или судорогами конечностей, появлением цианоза кожных покровов (появление синюшной окраски кожи, чаще в области носогубного треугольника).

Температура тела выше 38 °С (у детей в возрасте до 3-х лет), которая не снижается после применения немедикаментозных средств охлаждения (раскрыть ребенка, раздеть, снять памперс с ребенка; положить пузырь со льдом на лоб, но обязательно через сложенную в 3 - 4 слоя хлопчатобумажную ткань), или после приема жаропонижающих препаратов; или, если эта лихорадка сопровождается вялостью, отказом от кормления, жидким стулом, сыпью, кашлем или рвотой.

Для детей первого года жизни повторные повышения температуры до 38 °С требуют врачебного осмотра.

2. Появление любой сыпи у детей первых 3-х лет жизни, особенно если эта сыпь сопровождается повышением температуры, рвотой, жидким стулом, вялостью, отказом от еды.

3. Отсутствие мочеиспускания в течение 6 часов (у детей старше 3-х лет) или в течение 3 - 4 часов (у детей в возрасте до 3-х лет) при наличии жидкого стула, рвоты, высокой лихорадки (выше 38,5 °С).

Если при жидком стуле и рвоте у ребенка отсутствует желание пить, отмечаются сухие губы и кожа, наблюдаются необычная сонливость или возбуждение, а у детей в возрасте до 1 года, кроме этого, западает родничок.

4. Рвота с примесью желчи, крови, или рвота, которая сопровождается вялостью и заторможенностью. У детей в возрасте до 3-х лет - любая повторная рвота или рвота, возникшая на фоне лихорадки, заторможенности, сонливости, а также резко усилившееся срыгивание. Многократная рвота (более 4 раз) у детей более старшего возраста.

5. Стул с примесью крови, сопровождающийся болями в животе и высокой лихорадкой, особенно у детей до года.

Жидкий стул, сопровождающийся рвотой, болями в животе, особенно повышением температуры.

6. Ребенок, долго и непонятно по какой причине плачет, особенно если плач усиливается при попытке взять ребенка на руки знакомым человеком (например, мамой).

7. Затруднение дыхания, которое сопровождается осиплостью голоса и кашлем. Наиболее опасно данное состояние у детей до 3-х лет, которое часто возникает на фоне высокой лихорадки и нередко развивается ночью, между 2 - 4 часами ночи. Необходим срочный!!! вызов скорой медицинской помощи.

8. Высокая частота дыхания (одышка) у детей в возрасте до 3-х лет (более 60 в 1 минуту) при нормальной температуре тела и отсутствии явного возбуждения.

9. Кровотечение любой локализации, стул кровавого или черного цвета, рвота "кофейной гущей", кровь в моче. Носовое кровотечение, которое при оказании соответствующей самопомощи не удается остановить в течение 10 - 15 минут.

10. Если после травмы головы наблюдается рвота, заторможенность, сонливость или, наоборот, возбуждение.

11. Нарушение сознания, невозможность разбудить ребенка, необычная для ребенка вялость, заторможенность, сонливость. У детей в возрасте до 3-х лет - резкие изменения в поведении, невозможность контакта с родными, адекватного для возраста ребенка.

12. Самовольный прием ребенком медицинских препаратов. Необходимо обратиться за медицинской помощью немедленно!!!, даже если ребенок на настоящий момент чувствует себя хорошо - действие лекарств может появиться позднее, и ценное время для оказания помощи будет упущено.

13. Появление покраснения, отека, кожного зуда, затрудненного дыхания, нарушения глотания после:

- приема или инъекций медикаментов (особенно после приема нового лекарственного препарата);

- употребление высокоаллергенных продуктов (цитрусовые, ракообразные, окрашенные напитки, шоколад, мед, чипсы и др.) либо продуктов, впервые принимаемых;

- укусов насекомых (кроме того появление отека на месте укуса насекомого величиной более грецкого ореха).

14. Ожог любой локализации, сопровождающийся появлением пузырей или покраснением и занимающий в сумме площадь более 1 ладони ребенка, требует немедленного вызова скорой медицинской помощи и госпитализации в специализированное отделение.

15. Гнойные выделения любой локализации (в том числе из носа, уха, мочеполовых органов, гнойные налеты на миндалинах).

16. Если родители (или кто-либо еще) видели, что ребенок держал в руках, или играл с какими-нибудь сыпучими предметами (или предметами небольшой величины) и при этом поперхнулся и появился надсадный кашель и возможно цианоз необходим срочный вызов!!! скорой медицинской помощи и госпитализация.

17. Появление судорог независимо от причин их вызвавших.
